

## Tabellarische Übersicht zu den im System beteiligten Insektengruppen und -arten

Nr.	Systematische Gruppe	A	B	C	D
	<b>Cynipidae (Gallwespen)</b>				
1	<i>Diplolepis rosae</i> (LINNAEUS) [Gemeine Rosengallwespe]	●	*	○	*
2	<i>Periclistus brandtii</i> (RATZEBURG) [Schwarze Rosengallwespe]	●	1	○	I
	<b>Ichneumonidae (Schlupfwespen)</b>				
3	<i>Orthopelma mediator</i> (THUNBERG) [Gelbe Rosenschlupfwespe]	●	1	●	P
	<b>Chalcidoidea (Erzwespen)</b>				
	<b>Torymidae</b>				
4	<i>Glyphomerus stigma</i> (FABRICIUS) [Gezeichnete Rosenerzwespe]	●	1,2	●	P(H)
5	<i>Torymus bedeguaris</i> (LINNAEUS) [Langstachelige Rosenerzwespe]	●	1,3	●	P(H)
6	<i>Torymus rubi</i> (SCHRANK) [Schranks Rosenerzwespe]	○	1	●	P
	<b>Eurytomidae</b>				
7	<i>Eurytoma rosae</i> NEES [Räuberische Rosenerzwespe]	○	1,2,5	●	H(P)
	<b>Eupelmidae</b>				
8	<i>Eupelmus urozonus</i> DALMAN [Breitfüßige Rosenerzwespe]	○	1	●	P
	<b>Pteromalidae</b>				
9	<i>Pteromalus bedeguaris</i> THOMSON [Gemeine Rosenerzwespe]	●	1,3,4,5	●	P(H)

### Legende:

Spalte **A** (Häufigkeitseinschätzung der Arten)

- - Häufige Art, im Regelfall anzutreffen.
- - Seltene Art, in Ausnahmefällen, oder nur in bestimmten Regionen präsent.

Spalte **B** (Bezüge im Nahrungsnetz)

- \* - Cecidien (Gallen) verursachende Art (Gallerzeuger).
- 1-10 - Bezüge im Nahrungsnetz, genannt sind die Artnummern (Spalte **Nr.**), fett dargestellt sind die jeweils häufigeren Wechselbeziehungen.

Spalte **C** (Larvennahrung)

- - Phytophage Art.
- - Carnivore, oder vorwiegend carnivore Art.

Spalte **D** (Lebenformtypen)

- \* - Cecidien ((Gallen) verursachende Art (Gallerzeuger).
- I - Inquiline Art.
- P - Parasitoide Art.
- H - Hyperparasitoide Art.